



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü



DOMATES

Hastalık ve Zararlıları ile

Mücadele



Ankara - 2011



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

** Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır.*

**Yetiştiricilikle ilgili bölümler Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü uzmanlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.*



Ö N S Ö Z

Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarara neden olan toplam 528 hastalık etmeni, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır. Bunlarla gerekli mücadele çalışmaları yapılmadığında ürün kaybı ortalama %35 dolaylarında olmaktadır. Bu kaybın kültür bitkisine, zararlının tür ve yoğunluğuna bağlı olarak bazen % 100'lere ulaşabilmesi mümkündür. Bitkisel üretimde ekonomik yönden oldukça büyük rakamlara ulaşan bu kayıpların önlenmesi bitki koruma çalışmalarını yeterli önemi vermek gerekmektedir.

Söz konusu çalışmaların insan sağlığı, agroekosistem, çevre ve biyolojik dengenin korunarak sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine uygun yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Bakanlığımızın bu konuda belirlediği strateji Ülkemizde yıllık olarak kullanılan pestisit miktarının azaltılmasını ve kullanılan miktarın da doğru kullanımını öngörmektedir. Bunu sağlamak için, kimyasal mücadeleye alternatif olan biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler, kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele metotlarına ve **Entegre Mücadele Programlarının** yaygınlaştırılmasına öncelik verilmektedir.

Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde tavsiye dışı tarım ilacı kullanımı, kullanılan Bitki koruma ürünlerinin yanlış uygulanması, bitkilerde fitotoksisite, etkisizlik, tarımsal ürünlerde kalıntı ile iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Bu nedenle üreticilerimize yetiştirdikleri ürün ve kullanacakları ilaçlar konusunda rehber olabilecek bir kaynağın hazırlanarak siz değerli çiftçilerimize ulaştırılması doğru ilaçlama yapılmasını sağlayacak ve ilaç kalıntı probleminin çözümünü kolaylaştıracaktır.

Bu amaçla hazırlanan bu kitapçık sayesinde; üreticiler tarımsal ürünlerde hangi zararlı organizma için hangi ilacın; ne zaman, hangi dozda kullanılacağını, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreyi öğrenerek, ilaç kalıntısından arı ürünler yetiştirebileceklerdir.

Hazırlanan bu esere emeği geçenlere teşekkür eder, üreticilerimize kalıntısız, sağlıklı ürün ve bol kazanç dilerim.

Mehmet Mehdi EKER
Tarım ve Köyışleri Bakanı



İÇİNDEKİLER

DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ	5
DOMATESTE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (<i>Botrytis cinerea</i>)	13
BAKTERİYEL SOLGUNLUK VE PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	15
SOLANACEAE FAMILYASI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE STOLBUR	17
SEBZELERDE SEPTORIA LEKE HASTALIĞI (<i>Septoria apicola</i> , <i>Septoria lycopersici</i>)	18
KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI (<i>Phytophthora capsici</i>)	20
DOMATESTE BAKTERİYEL KANSER VE SOLGUNLUK HASTALIĞI (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>)	21
DOMATES ÖZ (GÖVDE) NEKROZU HASTALIĞI (<i>Pseudomonas corrugata</i>), (<i>P. viridiflava</i>), (<i>P. cichorii</i>), (<i>P. mediterranea</i>), (<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>) (<i>E. c.</i> subsp. <i>atroseptica</i>), (<i>E. chrysanthemi</i>)	22
DOMATESTE BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>)	23
DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (<i>Phytophthora infestans</i>)	25
DOMATES YAPRAK KÜFÜ HASTALIĞI (<i>Cladosporium fulvum</i>)	29
ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI (<i>Alternaria solani</i>)	31
DOMATESDE BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞI (<i>Xanthomonas vesicatoria</i>)	33
PATLICANGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI (<i>Leveillula taurica</i>)	35
SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	37
SEBZE FİDELERİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (ÇÖKERTEN) HASTALIĞI (<i>Phythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Alternaria</i> spp., <i>Sclerotinia</i> spp.)	39
DOMATES GÜVESİ (<i>Tuta absoluta</i>)	41
SEBZELERDE BEYAZSİNEK Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	45
DOMATES PAS AKARI (<i>Aculops lycopersici</i>)	47
KIRMIZIÖRÜMCEKLER İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) Pamuk kırmızıörümceği (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	49
SEBZELERDE THRİPSLER Tütün thrips (Thrips tabaci) Çiçek thrips (Frankliniella occidentalis)	52
SEBZELERDE YAPRAKBİTLERİ Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii), Bakla yaprakbiti (Aphis abae), Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) Patates yaprakbiti (Macrosiphum euphorbiae) Lahana yaprakbiti (Brevicoryne brassicae)	53
YAPRAK GALERİ SİNEKLERİ (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis, Phytomyza horticola)	55
SEBZELERDE YEŞİLKURT [Heliothis armigera, Heliothis virescens (=Heliothis dipsacea)]	57
SEBZELERDE DANABURNU (Gryllotalpa gryllotalpa)	59
SEBZELERDE TELKURDU (Agriotes spp.)	61
DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (Tomato Spotted Wilt Tospovirus)	63
DOMATES MOZAYİK VİRÜSÜ (Tomato Mosaic Tobamovirus)	64
HIYAR MOZAYİK VİRÜSÜ (Cucumber Mosaic Cucumovirus)	65
Domates Tarlalarında Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri	66



ÖRTÜ ALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

Domates, Dünyada üretimi yapılan en önemli sebze türlerinden biridir. Domatesin anavatanı, Peru ve Ekvatorun yer aldığı Güney Amerika ülkeleridir. Domates, ilk defa Meksikalılar tarafında kültüre alınmış ve Yeni Dünyanın keşfinden sonra Amerika'dan Avrupa'ya ve Dünyanın diğer tarafların yayılmıştır. Ülkemize 1900 yılların başlarında Adana'da yetiştirilmeye başlanmıştır.


Ülkemizde örtü altı sebze yetiştiriciliği 1950'li yıllarda başlanmış olup, 1990'lı yıllara kadar yavaş bir büyüme göstermiş, 1990'lı yıllardan sonra ise hızlı bir artış meydana gelmiştir. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde türler karşılaştırıldığında en büyük payı domates almaktadır.

Domates, kısa vejetasyon süresinde yüksek verimliliği ile her yıl artan üretim ve tüketim miktarı yüksek ticari öneme sahip bir bitki türüdür. Aynı zamanda, içermiş olduğu vitaminler, mineraller amino asit, seker ve lifler ile iyi bir besin kaynağıdır.

Domates, meyvesi yenen sebzeler içinde en çok tüketilen önemli sebzelerden birisidir. Ülkemizin tüm tarımsal alanlarında açıkta yetiştiriciliği yapılmasına rağmen, örtü altı yetiştiriciliği, daha çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde yapılmaktadır.

Büyüme tipi açısından domates üç gruba ayrılır.

1. Bodur domatesler
2. Yarı bodur domatesler
3. Sırık domatesler



Sırık domatesler örtüaltı yetiştiriciliği için uygun tiplerdir.

Domates tohumu çimlendikten sonra toprak yüzeyine çıkan fidede 2-7 adet yapraklı boğum oluştuğunda, sürgün ucunda başkalaşım meydana



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

gelerek, çiçek tomurcuğu oluşur ve bu yüzden bitkinin boyuna büyümesi durur. Ancak çiçek salkımını taşıyan yaprak koltuğundaki yan sürgün tomurcuğu uyanarak sürer ve bitkinin boyuna uzaması bu yan sürgün vasıtasıyla devam eder. Bundan sonraki her sürgünde 1-3 yapraklı boğum oluşturduğunda, yukarıda anlatılan olay aynen tekrarlanır. Böylece sırik domateslerin boylanması 2-5 m'ye kadar devam eder. Bodur domateslerde ise oluşan çiçek tomurcuğunun yanından yeni bir büyüme ucu oluşmaz boylanma devam etmez.

Domateste çimlenmeyle beraber oluşan kökçük uzatarak kazık kökü oluşturur. Kazık kök, uzamaya devam ederken üzerinde yan kökler oluşur uygun koşullarda kökler 1,5-5 m ye uzayabilir. Örtü altı koşullarında yetiştirilme dönemine ve çeşitlere göre değişmekle birlikte kökler 30-40 cm yayılabilir ve 60 cm derinliğe kadar inebilirler.

Gövde başlangıçta otsu yapıda iken, yaşlandıkça odunsulaşır, fakat buna rağmen artan bitki ve meyve ağırlığını taşıyabilecek kapasitede değildir. Bu sebeple başlangıçta dik duran gövde, zamanla yer üzerinde yayılmaya başlar.

Domates 6-7 gerçek yapraktan sonra ilk çiçek salkımı görülür. Sonraki çiçek salkımları birinci çiçek salkımından sonraki 2-4 yapraktan sonra meydana gelir. Salkımdaki çiçek sayısı 3 den 400 değişiklik gösterebilir. Çiçek salkımları basit (tekli) veya bileşik (dallanan) yapıda olabilir.

İklim İstekleri

Domates, ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Soğuklardan hoşlanmaz. Yetiştirme döneminde sıcaklık -2°C ye düşerse, bitki tamamen zarar görür. Sıcaklık, 14°C altına düştüğü zaman olgunlaşma gecikir ve verim düşer. Bitki büyümesi için en uygun sıcaklık, $22-26^{\circ}\text{C}$ 'dir. Sıcaklık 15°C 'nin altına ve 35°C 'nin üstüne çıktığı zaman meyve tutumunda düzensizlikler olmaktadır. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının $8-12^{\circ}\text{C}$ derece olması istenir. 11°C altındaki sıcaklıklarda çiçekler açar, ancak tozlanma ve döllenme açısından problemler yaşanır. İyi bir tozlanma ve döllenme için sıcaklığın en az $16-17^{\circ}\text{C}$ den yüksek olması gerekir.

Genel olarak sıcaklık 24°C 'nin üzerine çıktığında, seralar havalandırılmaya başlanmalıdır. Sera içinde oransal nem, % 65-70 olmalıdır. Döllenme için ise nemin %70-80 olması gerekir. Domates yetiştiriciliğinde ışığın da önemi büyüktür. En az 6 saat doğrudan güneş ışığı alan yerlerde yetiştirilmelidir. Isının yüksek, ışığın düşük olduğu dönemlerde bitki zayıf gelişir ve boya kaçır, ısının düşük ışığın yüksek



olduğu dönemlerde ise bitki gelişimi yavaşlar. Düşük ışıklandırmada şiddetli meyve dökümleri görülmektedir.

Toprak İsteği

Domates, toprak bakımından fazla secici değildir. Hava ve su tutma kapasitesi iyi ve tuzluluk içermeyen derin topraklardan hoşlanır. Kumlu topraklardan hafif killi topraklara kadar hemen her toprak tipinde yetişir. Derin, geçirgen, su tutma kapasitesi iyi, organik ve besin maddelerince zengin pH'sı 5-7 (hafif asit) olan topraklarda en iyi sonucu verir. Domates derin köklü bir bitki olduğu için yapılacak toprak işleminde sürüm derince yapılmalıdır.

YETİŞTİRİCİLİĞİ

Çeşit Seçimi

Domateste çeşit seçimini pazar istekleri, yetiştiricilik dönemi, yetiştiricilik yapılan bölgede zarar yapan hastalık ve zararlı etmenlerin varlığı gibi birçok faktör etkiler. Günümüz koşullarında F₁ çeşitler yüksek verim, kalite ve hastalıklara dayanıklılık özellikleri ile ön plana çıkmışlardır.

Ülkemizde örtü altında farklı dönemlerde yetiştiricilik yapılmakta ve bu dönemlerde de iklim özellikleri farklılık göstermektedir. Çeşit seçimi yapılırken verimli, hastalık ve zararlılara dayanıklı, kaliteli, Pazar isteklerine uygun ve yetiştirme dönemine uygun çeşitler seçilmelidir.

Ana Ürün Dönemi	Yetiştirme Dönemi	Dikim tarihleri	Hasat tarihi
Çift Ürün	Sonbahar	Ağustos-Eylül	Kasım-Şubat
	İlkbahar	Ocak-Şubat	Nisan-Temmuz
Tek Ürün		Ekim	Şubat-Temmuz

Yetiştirme Tekniği

Domates tohumu, yetiştiricilik yapılacak alana doğrudan ekilebildiği gibi, günümüzde yetiştiricilik; tohum sarfiyatının azaltılması, erkencilik sağlaması, düşük çimlenmeyi ve düzensiz çıkışı önlenmesi, toprak koşullarının tohumla ekime uygun olmaması, uygun tohum ekim mibzerlerinin yokluğu ve yazlık sebzeler için erken ilkbahar döneminde düşük sıcaklık risklerinden kaçınmak gibi nedenlerle fideler yetiştirilerek elde edilen **hazır fidelerin**, yetiştiricilik yapılacak alana şaşırtılması yoluyla yapılmaktadır



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI


Fide yetiştiriciliğinde, genel olarak (torf, perlit, vermikulit) veya (torf, perlit, toprak) veya (yanmış hayvan gübresi, kum, toprak) gibi karışımlar kullanılır. Yanmış hayvan gübresi, kum, toprak karışımında 1:1:1 oranı kullanılır. Torf, perlit, toprak karışımında 2:1:1 oranı kullanılmaktadır. Hazırlanan fide yetiştirme ortamları, viyoller veya plastik torbalara doldurulur. Fide yetiştirme materyali ile doldurulmuş fide torbalarının veya viyollerin iyice sulanması ve sonra tohum ekiminin yapılması gerekir.

Tohumların 3-4 saat ıslatıldıktan sonra ekilmeleri çimlenmeyi kolaylaştırır. Tohumlar 1-3 cm. derinliğinde ekilmelidir. Tohum ekimini takiben tekrar hafifçe sulanması faydalıdır. Tohumların çimlenmesi için en uygun toprak sıcaklığı, 12-15 °C olmalıdır. Bu sıcaklıklarda tohumlar 5-13 gün içinde çimlenir. Tohum ekiminden 5-7 hafta sonra elde edilen fideler asıl yetiştiriciliği yapılacak olan araziye dikilebilir.

Örtü altı domates yetiştiriciliğinde kullanılan tohumların çok pahalı olması ve çiftçi şartlarında fide yetiştiriciliğinde tohum kaybının çok olması sebebi ile daha ekonomik bir yetiştiricilik için fide firmalarında temin edilen fideler vasıtası ile yetiştiricilik yapılmaktadır.

Dikim Yerlerinin Hazırlanması ve Dikim

Serada toprak hazırlığı yapılırken, toprak analizleri yapıp gerekli taban gübreleri verildikten sonra son kez sulama yapılır ve toprak tava geldiğinde derin bir şekilde devirmeden sürüm yapılır ve dikim yerleri hazırlanır. Dikim tek sıralı düşünülüyorsa, 100x50, 80x50, 90x40 ölçülerinde; çift sıralı düşünülüyorsa, 120x(60x40), 100x(60x50) ölçülerinde ve kuzey-güney istikametinde yapılır. Dikim yapılacak fidelerin uygun büyüklüğü, 5-6 gerçek yapraklı olduğu dönemdir. Özellikle yaz aylarında dikim işlemi öğleden sonra veya bulutlu havalarda yapılmalıdır ki fideler fazla su kaybından zarar görmesin. Diğer bütün fidelerde olduğu gibi şaşırtmada en önemli konu can suyudur.



**Gübreleme**

Çiftlik gübresi, toprağa ve üzerinde yetiştirilecek ürünlere gerekli besin maddelerini sağlar. En önemli yararı, toprağı humus yönünden zenginleştirmesidir. Çünkü çiftlik gübresinde bulunan besin maddeleri, ticari gübrelere göre çok düşük oranlardadır. Bunun yanında, humusun sağladığı yararlar ise oldukça fazladır. Bu yararları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Humusça zengin olan toprakların işlenmesi daha kolay olur.
- Toprağın su tutma ve havalandırma özelliği artar.
- Toprağın mikroorganizma faaliyeti artırılır. Böylece bitkinin alacağı besin maddesi alımına yardımcı olunur.
- Humusla fazla ağır ve killi topraklarla, hafif ve kumlu toprakların olumsuz yönleri giderilir ve sebze tarımına daha yararlı bir şekilde gelmesini sağlar.
- Toprakta besin maddelerinin tutunmasını sağlar.
- Toprak tuzlanması önüne geçer. Tuzluluğu azaltır.
- Az miktarda besin maddesi verir.

Domates yetiştiriciliği için, ticari gübrelere dışında, dekara önerilen çiftlik gübresi 3-5 ton'dur. Bu miktar çiftlik gübresi hiç olmazsa 2-3 yılda bir defa tarlaya verilmelidir. Ancak kullanılacak çiftlik gübresinin taze olmaması, en az bir yıl eskimiş yani yanmış olması faydalıdır. Yanmamış çiftlik gübrelere kullanılmamalıdır.

Domateste ilk meyve büyümeye başlayıncaya kadar azotlu gübre uygulamalarına dikkat etmek gerekir. Bu aşamaya kadar bitkinin azot ihtiyacı düşüktür. Erken dönemdeki fazla azotlu gübreleme bitkilerin vejetatif olarak aşırı gelişmesine neden olurken meyve tutumunu azaltır. Domateste kaliteyi en çok etkileyen element potasyum olup, azot potasyum oranı en az 1/2 veya 2/3 düzeyinde tutulmalıdır. Domates üretiminde toplam azotun %10-30 u toprakta tutunması iyi olan fosforun %90-100 ü ve potasyumun %50-60 ı fide dikimi öncesinde taban gübresi olarak verilirken geriye kalan kısımlar üst gübre olarak tatbik edilir. Domates yetiştiriciliğinde iyi yanmış çiftlik gübresi de kuşkusuz diğer birçok üründe olduğu gibi domates de çok önemlidir.

Sulama

Serada domates yetiştiriciliğinde sulamaya çok dikkat etmek gerekir. Dengeli bir gelişme için bitki meyveye yatana kadar az fakat sık sulama yapılmalı meyve tutumundan itibaren su miktarı artırılmalıdır. Can suyu bolca verilmeli daha sonraki sulamalar az olmalıdır. Bu, bitki kök gelişimini teşvik eder.



Askiya Alma

Serada domates yetiştiriciliğinde daha çok sırik çeşitler kullanılır. Tek başına dik büyüemeyen domates bitkilerinin mutlaka askıya alınmaları veya bir herekle dik durmalarının sağlanması gerekir.

Askiya Alma;

- 1-Bitkileri dik tutabilmek
- 2-Bitkilerin ışıık gören yüzeyini arttırmak
- 3-Sere içindeki hava hareketini sağlamak
- 4-Verim ve kaliteyi artırmak
- 5-Erkencilik sağlamak
- 6- Bakım ve hasat işlemlerini kolaylaştırmak
- 7-Bitki ömrünü uzatmak için önemli bir uygulamadır.

Askıda dikkat edilecek en önemli konu, özellikle meyveler oluştuğunda bitkilerin alacağı ağırlığı çekecek dirence sahip yapıların inşasıdır. Bu yapılara her bitki için ayrı ip bağlanır. İpler bitkiye 3. veya 4. yaprağın gövdeye birleştiği yerin altından gövdeyi boğmayacak şekilde bağlanır. Askıya alma işlemi bitkilerin elastik olduğu öğleden sonra yapılmalıdır ki bitkide yaralanmalar oluşmasın. Askıya alınan bitkilerin boyları aynı hizada olmalıdır. Bitkiler aynı hizada olamazsa aşağıda kalan bitkiler gölgede kalacağı için verimliliği düşecektir.

Budama

Örtü altı domates yetiştiriciliğinde yapılacak diğer önemli bir işlem, topluca budama denilen koltuk alma, yaprak alma ve uç alma işlemleridir. Domateste gövde ile yaprak sapı arasındaki gözlerde çıkan sürgünlere koltuk adı verilir. Bu sürgünlerin alınması işlemine de koltuk alma denir. Tek gövdeli olarak büyümesini istediğimiz bitkinin şeklini korumuş oluruz. Koltukların alınma devresi 5-15 cm boya eriştikleri zamandır. Erken koparıldıklarında yeniden çıkma ihtimalleri varken, geç koparıldıklarında hem boşa besin maddesi tüketmiş olurlar hem de bitkide açılacak yara yüzeyi artmış olacaktır. Koltuk alma işlemi bitkinin su içeriğinin yüksek olduğu sabah saatlerinde yapılmalıdır. Bu budama için gereken işçilik azaltacağı gibi koltukların bitkiden kolay ayrılması sebebi ile daha az yara tabası oluşur.




Yaprak alma diğer bir budama şeklidir. Olgunlaşmaya başlayan salkımların altındaki yapraklar alınarak olgunlaşma hızlandığı gibi havalandırma ve ışııklanma da sağlanmış olur. Ayrıca yaşlı ve hasta



yapraklarda alınır. Yapraklar aşağı doğru değil de yukarı doğru koparılmalıdır. Bir başka budama şekli de uç almadır. Bitkilerin fazla uzamalarını engellemek için uç alma işlemi yapılır.

Uç alma işlemi, planlanan son hasat tarihinden kış aylarında 8-12 hafta, yaz aylarında 5-6 hafta önce bırakılacak son salkımın 3-4 yaprak üzerinden yapılır. Uç alma işlemi ayrıca bitkinin gelişmesini durdurarak meyvenin olgunlaşmasını hızlandırır.

Domates bitkisi, sabahtan öğleye kadar su içeriği yüksek olduğu için daha kırılıgandır. Bu sebeple bütün budama işlemleri bu aralıkta yapılmalıdır. Bu işçilik süresini ve yara tabakası oluşmasını azaltır. Budamada dikkat edilecek diğer önemli bir nokta ise budama yapılırken tırnak tabakası bırakılmamalıdır.



Havalandırma

Örtü altı domates yetiştiriciliğinde en önemli kültürel işlemlerin biride yetiştirme ortamının havalandırılması işlemidir. Güneşli bir günde dış ortam soğuk olsa bile örtü altı koşulları bitki için optimum iklim koşullarının üstüne çıkabilir. Örtü altı koşullarında hava oransal nemimin % 60-90 arasında olması istenir. Hava oransal nemi optimum koşullardan aşağı düşerse verim ve kalite kayıplarına sebep olur. Üstüne çıkarsa hastalık ve zararlı yoğunluğu artar. Erken sonbahar veya geç ilkbahar



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

da havalandırma ile ortam sıcaklıkları yeterli düzeye düşmeyebilir Bu dönemlerde gölgeleme materyalleri ile sera gölgelendirilmeli ve ortam sıcaklıkları düşmesi sağlanmalıdır.

HASAT

Serada Tek Ürün yetiştiriciliğinde Şubat ayında başlayan hasat, Temmuz ayına kadar sürer. Sonbahar yetiştiriciliğinde, Kasım ayı ortalarında başlar, Şubat ayı ortalarında biter. İlkbahar yetiştiriciliğinde ise Nisan ayından Temmuz ayına kadar sürebilir.

Domatesin yeşilden kırmızıya kadar oluşan farklı olum dönemlerinde hasat edilebilmesi nedeniyle, hasat zamanı; pazara olan uzaklığa, yol durumuna ve tüketici istekleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

- Hasat yapılırken dikkate edilmesi gereken en önemli konular şunlardır.

- Hasat yapan işçilerin hasadın nasıl yapılacağını bilmelidirler.
- Hasat havanın kuru ve serin olduğu sabah saatlerinde yapılmalıdır.

Domatesi hasat eden işçilerin elleri temiz olmalı ve hasat yaparken meyveyi fazla sıkarak zarar vermemelidirler.

Hasat sırasında kullanılan kaplar, hasat edilen meyveye zarar vermeyecek şekilde yumuşak ve temiz olmalıdır. Hasat sırasında kullanılan taşıma kapları tamamen doldurulmamalıdır. Hasat edilen domatesler, taşıma kabına yavaş bırakılmalıdır. Hasat edilen domatesin toplandığı yer temiz olmalı ve direk güneş ışığı almamalıdır.



DOMATESTE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI

(*Botrytis cinerea*)



Hastalık Belirtisi

- Her bitkide birbirinden farklı belirtilere neden olur.
- Hastalık gövde ve meyvelerde zarar meydana getirir.
- Lekeler önceleri toplu iğne başı büyüklüğünde olup bitkinin iç kısmında gelişerek genişler ve dokulara yayılırlar.
- Bitki dokusu çatlar ve konukçunun su kaybına neden olur.
- Gövde ve meyve sapı lekeleri nedeniyle meyve dökümü ortaya çıkar.
- Konukçunun çiçek zamanında taç yaprakları hastalığa çok duyarlıdır. Hastalık etmeni bu kısımlardan girerek meyveye geçer ve meyve çürüklüğünü başlatır.
- Yumrulu bitkilerde lekeler büyüdükçe yumuşak çürüklük oluşur.
- Hastalığın gelişmesi için en uygun koşullar 20–25 °C sıcaklık ve %95–98 orantılı nemdir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

Bu hastalık hemen hemen tüm sebzelerde görülür.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Seralarda iyi bir havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önlenmelidir.
- Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalıdır.
- Hastalıktan zarar görmüş olan bitkiler sökülerek imha edilmelidir.
- Dengeli gübreleme ve iyi bir bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalıdır.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Çiğ olasılığına karşı güneş batımından 2 saat önce seralar ısıtılmalıdır.
- Hasattan sonra hastalık etmeninin dayanıklı yapılarının toprağa karışmasını önlemek için bütün bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

- Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.
- İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozları


Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
		100 l suya	Dekara	
Bacillus subtilis % 1.34 QST 713 ırkı	SC		1400 ml (sera)	-
Bacillus subtilis Y 1136	WP		25 g	-
Boscalid % 26.7+ Pyraclostrobin % 6.7		150 g (Sera)		3
Captan % 50	WP	250 g		7
Cyprodinil+Fludioxonil %37.5+%25	WG	60 g		7
Diethofencarb 250 g/l+ Carbendazim 250 g/l	SC	70 ml		14
Fenhexamid % 50	WP	100 g		7
Fenhexamid 500 g/l	SC	100 ml		7
Imazalil 500 g/l	EC	30 ml		3
Polyoxin AL %50	WP	25 g (Sera)		3
Iprodione % 50	WP	75 g		7
Pyrimethanil 300 g/l	SC	125 ml		3
Tolyfluanid %50	WP	200 g		7
Tricoderma harzianum rifai ırk %1.15	WP	60 g		-
Streptomyces lydicus WYEC 108	CP	90 g (Sera)		-
Reynoutria spp. 200g/l		125 g(sera)		-
Hidrojen peroksit + asetik asit 260g/l+90g/l		500 g(sera)		-

AB'ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı



BAKTERİYEL SOLGUNLUK VE PATATES KAHVERENGİ ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI

(*Ralstonia solanacearum*)



Hastalık Belirtisi

• Hastalık etmeni bir bakteridir. Domates ve patates bitkisini kökleri yoluyla hastalandırır. Etkili bir mücadele yöntemi yoktur. Bu hastalıkla bulaşık olan tarlalarda domates ve patates tarımına 5 yıl süreyle izin verilmez.

• Domates ve patatesin yeşil aksamındaki (gövde ve yapraklar) ilk belirtiler, sıcak günlerde dalların uçlarındaki yapraklarda meydana gelen solgunluktur. Susuzluktan dolayı oluşan solgunluktan farkı gece serinliğinde solgunluğun kaybolmamasıdır.

• Hastalık geliştikçe kök boğazının hemen üzerindeki bölgede çizgi şeklinde kahverengileşme ve yapraklarda bronzlaşma görülür. Bu tür belirti gösteren bitkilerin gövdeleri boyuna kesildiğinde iletim demetlerinde kahverengi renk değişikliği görülür.

• Ayrıca bu tür belirti gösteren bitkilerin gövdeleri kesildiğinde veya kırıldığında beyaz, sümüksü bir akıntının çıktığı görülür.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

• Domates, patates ve köpek üzümü gibi yabancı otlar, ayrıca Solanaceae familyasından diğer bitkiler.

Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler

- Sertifikalı fide ve tohumluk kullanılmalıdır.
- Hastalığın görüldüğü tarlalarda 5 yıl süreli nadas veya 3 yıl nadas daha sonra 2 yıl süreyle hububat ekimi yapılmalıdır.
- Sulama kanallarının kenarlarında yetişen köpek üzümü gibi yabancı otlar imha edilmelidir.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Kullanılan tüm makine, alet ve depolama alanları uygun bir dezenfektan ile temizlenmelidir.

Kimyasal önlemler: Etkin ve ekonomik bir Kimyasal Mücadele yöntemi yoktur.

Not: Bu hastalık iç ve dış karantinaya tabi olup, hastalıkla ilgili belirtilere rastlandığında en yakın Tarım Teşkilatına haber veriniz.



SOLANACEAE FAMILİYASI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE STOLBUR



Hastalık Belirtisi

• Bu hastalığı oluşturan bir fitoplazmadır . Yaprak pireleri bu hastalığın taşıyıcısıdır. Tarla sarmaşığı ve küsküt yoluyla da bir bitkiden diğerine taşınabilir. Mekanik yolla ve temasla geçmez.

• Hastalık tarlada bulaştıysa patatesten ilk belirtiler, uç yapraklarda morumsu renk değişimi ve külâh şeklinde kıvrılma ile birlikte sararma şeklinde görülür. Bitkinin boğum araları kısalmaya, boğumlar ve koltuk sürgünleri kalınlaşmaya başlar ve ileri safhalarda koltuk yumruları oluşur. Aynı dönemde kök boğazında havai yumrular da oluşmaya başlar. Solgunlukla

birlikte kökler tamamen ölür. Olgunlaşmamış yumrulara pörsüme meydana gelir.

- Eğer hastalıklı yumru dikilmişse çıkan bitkide ilk belirtilerden sonra solma başlar ve yumru bağlamadan çiçeklenme devresinde bitki ölür ya da iplikli sürgün oluşur, yeşil aksam oluşmaz.
- Hastalığın depodaki belirtisi iplik şeklinde çimlenmedir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Patates, domates

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Ekim alanının çevresi yüksek ağaçlarla çevrilmemelidir.
- Yaprak pirelerinin yoğun olarak görüldüğü fundalık, orman kenarlarında ve yamaçlarda ekim yapılmamalıdır.
- Tarla içinde ve etrafındaki tarla sarmaşığı gibi yabancı otlar yok edilmelidir.
- Patates tohumluğu dikilmeden önce filizlendirilmeli, ipliğimsi filizler oluşturanlar ayıklanmalı ve bunlar dikilmemelidir.


Kimyasal Mücadele

- Etkin bir Kimyasal Mücadelesi yoktur, ancak bu hastalığı taşıyan yaprak pireleriyle mücadele yapılmalıdır.



SEBZELERDE SEPTORIA LEKE HASTALIĞI

(*Septoria apiicola*, *Septoria lycopersici*)



Hastalık Belirtisi

- Hastalık yapraklarda ve yaprak saplarında çok küçük, yuvarlak, kesin hudutlarla ayrılmış kahverengi lekeler halinde ve bitkinin önce yaşlı yapraklarında görülür
- Bu lekeler 3mm çapına kadar büyür ve merkezlerinin rengi açık kahverengi olur
- Üzerinde siyah veya koyu kahverenginde küçük yapılar vardır
- Zamanla lekeler büyür ve yaprağı kaplayacak kadar çok sayıda olur
- Hastalık şiddetli olduğu zaman meyvelerde ve yumrularda küçülmeler ve kalite bozuklukları meydana getirir

- Hastalığın şiddeti yağışlı ve rutubetli yıllarda daha da artar

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Domates, marul, maydanoz, soğan, kereviz, kabak

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Temiz tohum kullanılması
- Ekim nöbeti yapılması
- Hastalıklı bitkiler ve hasat artıklarının toplanıp yok edilmesi gerekmektedir

**Kimyasal Önlemler**

Hastalık görüldüğünde mücadeleye başlanır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)
		100 l suya	Dekara	
Ziram %80	WP	400g		14



KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI (*Phytophthora capsici*)



Hastalık Belirtisi

- Hastalık bitkinin değişik dönemlerinde ve organlarında görülebilir.
- Erken dönemde enfeksiyon olduğunda fideliklerde çökerten olarak etkili olur.
- Daha ileri dönemlerde bitkilerin kök boğazında önceleri koyu yeşil zamanla kahverengi siyaha dönüşen bir renk değişimi meydana gelir.
- Bu renk değişimi kök boğazını kuşak gibi sarar, enfeksiyon kök bölgesine ulaşır, kök kabuğu kahverengi bir renk alır ve çürür.
- Bu şekilde enfeksiyona uğramış olan bitkiler solamaya başlar, normal sulama ve bakım

işlemleri yapılsa da bitki kendini toparlayamaz.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Domates, kavun, karpuz, kabak, lahana, soya fasulyesi, pirinç, bezelye, marul, havuç, hıyar gibi kültür bitkileri ile Horozibiği, köpek üzümü gibi yabancıotlar hastalığın konukçularıdır.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Fide yetiştiriciliği yapılırken genel bir kontrol prensibi olarak tohumlar hastaliksız, sağlıklı bitkilerden sağlanmalıdır.
- Fidelikler hastaliksız, temiz yerlerde kurulmalıdır. Fideler aşırı sulanmamalı, sık sık havalandırılmalıdır.
- Dikim karık usulü yapılmalıdır. Fideler karık sırtına dikilmelidir. Mümkün olduğunca her karık ayrı ayrı sulanmalıdır.
- Bitkilere dengesiz gübreleme yapmamalı, özellikle aşırı azotlu gübre verilmemelidir.
- Hastalıklı bitkiler sökülüp imha edilmeli, hasat sonrasında da aynı işlem tekrarlanmalıdır.


Kimyasal Mücadele

- İlaçlı mücadelesi yoktur.



DOMATESTE BAKTERİYEL KANSER ve SOLGUNLUK HASTALIĞI

(*Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*)



Hastalık Belirtisi

- Hastalığı oluşturan bakteri tohumla taşınabilir. Ayrıca hastalıklı bitki artıklarıyla toprağı da bulaştırabilir. Tohumda bulunan bakteri doğrudan doğruya iletim demetlerine geçer ve bitkinin her tarafına yayılır.
- Domates bitkileri çiçek devresine yaklaştığında alt yapraklardan itibaren solma başlar ve zamanla yukarı doğru ilerler. Bu solgunluğun bitkinin tek tarafında görülmesi ve solan yaprakların zamanla kuruması hastalığın tipik belirtisidir.
- Solgunluk belirtisi gösteren bitki ortadan ikiye kesildiğinde iletim demetleri boyunca ince sarı, açık kahverengi renk değişikliği görülür.
- Hastalığın ileri devrelerinde domates gövdesinde yara ve çatlaklar oluşur. Bu nedenle hastalığa bakteriyel kanser de denir.
- Meyvelerde ise ortası açık kahverengi, çevresi beyaz haleli ve kuş gözü olarak tanımlanan lekeler oluşur.
- Hastalıkla bulaşık tohumların rengi değişir ve çimlenme gücünü yitirir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Domates, biber, köpek üzümü

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Temiz tohumluk kullanılmalıdır.
- Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.
- Seralar sık sık havalandırılmalı, seralarda domateste koltuk alma işlemi yapılırken hastalık görülen bitkiler en sona bırakılmalıdır.
- Hastalığın görüldüğü seralarda 2 yıl süreyle ekim nöbeti uygulanmalı, domates ve biber dışındaki bitkiler yetiştirilmelidir.

Kimyasal Mücadele

- Etkin ve ekonomik bir Kimyasal Mücadele yöntemi yoktur.



DOMATES ÖZ (GÖVDE) NEKROZU HASTALIĞI

(*Pseudomonas corrugata*), (*P. viridiflava*), (*P. cichorii*),
(*P. mediterranea*), (*Erwinia carotovora* subsp. *carotovora*)
(*E. c.* subsp. *atroseptica*), (*E. chrysanthemi*)



Hastalık Belirtisi

- Hastalığı oluşturan bakteriler toprak kaynaklıdır. Düşük gece sıcaklıkları ve yüksek orantılı nem hastalığı teşvik etmektedir.
- Üst yapraklarda solgunluk ile birleşen bir sararma görülür.
- Gövde üzerinde özellikle koltuk yerlerinde kahverengi siyah lekeler oluşur.
- Gövde, yaprak ve meyve sapları boyuna kesildiklerinde öz dokusunun kahverengi siyah renk aldığı görülür. Hastalığın ilerlemesiyle öz parçalanır ve boşalır.
- Hasta bitkiler genellikle ayakta kalır ancak bazen solgunluk ve ölüm ortaya çıkar
- Gövde üzerinde kök gelişimi gözlemlenebilir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Domates ve biber

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalı, bitkiler dengeli bir şekilde beslenmelidir.
- Hastalıklı bitkiler seradan uzaklaştırılmalıdır.
- Bakım işlemleri yürütülürken bitkiler yaralanmamalı ve seralarda koltuk alma işlemi yapılırken hasta bitkiler en sona bırakılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

- Etkin ve ekonomik bir Kimyasal Mücadele yöntemi yoktur.



DOMATESTE BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI

(*Pseudomonas syringae* pv. *tomato*)



Hastalık Belirtisi

- Yaprak, sap, çiçek ve meyve saplarında kahverengiden siyaha kadar değişen küçük lekeler oluşur.
- İlerleyen dönemlerde yapraklardaki küçük lekelerin birleşmesiyle daha büyük lekeler oluşur.
- Meyvelerde küçük, koyu kahverengi, yüzeysel kabarcıklar şeklinde lekeler görülür.
- Hastalığı oluşturan bakteri tohumla taşınabilir. Ayrıca hastalıklı bitki artıklarıyla

toprağı da bulaştırabilir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Domates, patlıcan ve biber

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Temiz tohumluk kullanılmalıdır.
- Fide döneminde Hastalık Belirtisi gösteren bitkiler fidelikten uzaklaştırılarak imha edilmelidir.
- Hastalıklı bitki artıkları yok edilmelidir.
- Fidelik ve seralar sık sık havalandırılmalıdır.
- Hastalığın görüldüğü seralarda 1 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele

- Fidelikte ve serada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak yeşil aksam ilaçlaması yapılmalıdır. Fide döneminde haftada bir, Tarla da 8-10 gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

Kimyasal Mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozları

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)
		100 l suya	
Bakır oksiklorür % 50	WP	300–400 g	14
Bakır kompleks % 21 + Mancozeb % 20	WP	300 g	7
Bakır hidroksit % 50	WP	250 g/da	7
Bakır oksisülfat % 52.5	WP	400 g	14
Mancozeb % 75	WG	200 g	14
Yağ ve Rosin asitlerinin bakır tuzları	EC	200 ml/da	7



DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (*Phytophthora infestans*)



Hastalık Belirtisi

- İlk belirtiler yaprak ve gövdede üstten bakıldığında soluk yeşil renkte büyük, daha sonra esmerleşen sınırları belirsiz lekelerdir.
- Rutubetli havalarda yaprağın altına bakıldığında grimsi renkte, ince tüylü bir misel tabakası meydana geldiği görülür.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Meyvede ise sapa bağılı kısma yakın küçük, gri kahverenginde lekeler meydana gelir. Bu lekeler süratle büyüyerek kesin hudutları belli olmayan kahverengi benekli çürüklük halini alır.
- Koşullar hastalık için uygun olduğu takdirde hastalık tüm bitkiye yayılır ve bitkide yanıklık şeklini alır ve onun kurummasına neden olur.
- Kışı hastalıklı bitki artıklarında geçirir, ayrıca tohumla da taşınabilir. Hastalığın gelişmesi ve yeni yerlere bulaşmasında serin, rutubetli havalar önemli rol oynar.
- Sıcaklık 19–22 °C ve orantılı nem % 80 ve üzerinde olduğunda salgın yapar.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Başta domates, patlıcan olmak üzere genellikle patlıcangiller familyasına ait yabani ve kültür bitkilerinde görülür.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Hastalıklı bitki artıkları ve meyveler toplanıp imha edilmelidir.
- Domates tarımı sabah ve akşam çiğ tutmayan güneşe bakan yerlerde yapılmalıdır.
- Hastalığın her yıl epidemiyi oluşturduğu yörelerde sırk domatesçiliği yapılmalı, sıralar hakim rüzgar yönünde olmalıdır.

Kimyasal Mücadele

- İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar gerçekleşir gerçekleşmez başlanmalıdır.
- Mildiyö daha çok yaprakların altında olduğu için ilaçlama sırasında mutlaka yaprak alt yüzeylerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç tabakası oluşturmaya özen göstermelidir.



Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
		100 l suya	Dekara	
Azoxystrobin 250 g/l	SC	75 ml		3
Bakır kompleksi+Mancozeb %21+% 20	WP	300 g		7
Bakır Kalsiyum Sülfat % 20	WP	600 g		14
Bakır oksiklorid % 50	WP	300 g		14
Bakır oksiklorid 700 g/l	SC	200 ml		14
Bakır Sülfat+Mancozeb %12+% 30	WP/WG	300 g		7
Bakır Sülfat Pentahidrat 65.82 g/l	SC	150 ml		7
Bakır Sülfat+Mancozeb+ Cymoxanil % 57.7+20+2.4	WP		400 g (Domates-Sera)	7
Captan % 50	WP	300 g		7
Captan % 80	WDG	185 g		7
Chlorothalonil 500 g/l	FL	175 ml		3
Chlorothalonil % 75	WP	150 g		3
Chlorothalonil+Bakıroksiklorid %25+%25	WP		250 g	14
Chlorothalonil+ Bakıroksiklorid 317 + 317 g/l	SC	230 ml		14
Chlorothalonil+Carbendazim 450+100 g/l	SC	200 ml Sera		7
Cymoxanil+Bakır % 4.20+39.75	DF	200 g		7
Cymoxanil+Bakır %3+% 22.5	WP	300 g		14
Cymoxanil+Mancozeb %5+%45	WP	300 g		14
Cymoxanil+Metiram %4.8+% 57	WG	200 g		21
Dimethomorph+Mancozeb %9+% 60	WP	250 g		7
Famoxadone+Cymoxanil %22.5+% 30	DF	40 g (Sera)	40 g/da (Tarla)	3
Famoxadone+Mancozeb %6.25+% 62.50	DF	80 g (Sera)	80 g/da (Tarla)	3



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
		100 l suya	Dekara	
Fenamidone+Mancozeb %10+%50	DF		150 g	15
Folpet %50	WP	300 g		7
Folpet % 80	WG		125 g	7
Fosetyl-AI %80	WP/WG	250g		7
Fosetyl-AI+Mancozeb %35+%35	WG	400 g		14
Fosforoz asit 600g/l	SL	300 ml(tarla)		-
Mancozeb % 80	WP	200 g		14
Maneb % 80	WP	200 g		28
Metiram % 80	DF	150 g		7
Metiram % 55 + % 5 Pyraclostrobin	DF	200 g		7
Propineb % 70	WP	200g		7
Phosphorous acid 400 g/l	SL	400 ml		-
Ziram % 80	WP	300 g		14
Zoxamide+Mancozeb %8.3+%66.7	WG	180 g		3
Bakır Hidroksit % 35	DF		150 g	14
Bakır Kalsiyum Sülfat % 20	WP	400 g		14
Bakır Oksiklorit %37,5	WG	300 g		21
Metalaxyl-M+Mancozeb % 4 + % 64	WG	250 g		10
Yağ ve Rosin Asitlerinin bakır tuzları 583 g/l	EC	200 ml		7
Bakır Hidroksit % 30	WG	150 g		3
Mancozeb + Bakır Oksiklorid+Cymonoxanil ve Bakır sülfat % 13.3+ % 30+ %4	WG	250 g		3
Phosphonous acid 60 g/l	SL	300 g (sera)		-
Mandipropomid+Mancozeb % 50+ % 60	WG		250 g	7
Mandipropomid % 50	WG	80 ml		3
Hidrojen peroksit + asetik asit 260g/l+90g/l		500 g		-

AB'ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı



DOMATES YAPRAK KÜFÜ HASTALIĞI (*Cladosporium fulvum*)



Hastalık Belirtisi

- Domates yaprakları üzerinde önce sarı renkli lekeler oluşur.
- Daha sonra bu lekelerin alt kısmına rastlayan yerde zeytin renginde veya kahverengimsi bir küf meydana gelir.
- Hastalık kısa zamanda bütün yaprakları kaplar ve bitkiyi kurutur.
- Hastalık için en uygun koşullar 20–25 °C sıcaklık ve % 95 orantılı nemdir.
- Yaprakların alt tarafında koyu renkli küf tabakası oluşturur. Hastalık genellikle seralarda görülür.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Hastalık domatese özgüdür.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Hastalıklı bitki artıkları imha edilmelidir.
- Seralarda iyi bir havalandırma yaparak orantılı nem ve sıcaklık azaltılmalıdır.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

Kimyasal Mücadele

- Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde (fidelerin seraya şaşırtılmasından 20 gün sonra) ilaçlamalara başlanmalıdır.
- İlaçlamalar sıcak zamanlarda yapılmamalı, serin ve rüzgârsız havalarda ve 10 – 15 gün ara ile yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
		100 l suya	
Captan % 50	WP	250 g	7
Maneb % 80	WP	200 g	28
Propineb % 70	WP	300 g	7
Tebunoconazole 250 g/l	EC	50 ml	7



DOMATESTE ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI (*Alternaria solani*)



Hastalık Belirtisi

- Bu hastalığa bitkilerin her devresinde rastlanır. Erken devrelerde fidelerde kök çürüklüğü veya kök boğazı yanıklığı yapar. İlk belirtiler yaşlı yapraklarda görülür.
- Yaprak, sap ve meyvede gayri muntazam küçük kahverengi lekeler halinde başlar. Lekeler iç içe daireler şeklinde 1–2 cm büyürler.

- Hastalığın şiddetli olması halinde bütün yapraklar kururlar.
- Çiçek ve meyve sapsarı hastalığa yakalanırsalar dökülürler, meyvelerde genellikle sapın tutunduğu kısımda koyu renkli çökük, çoğu zamanda sınırlanmış lekeler oluşur.
- Hastalık için uygun gelişme koşulları 28–30 °C'dir.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Hastalık domates, patlıcan, patates, lahana, karnabahar ve havuçta görülür.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Temiz tohum kullanılmalı
- Fidelekler ve seralar sık sık havalandırılmalı
- Aşırı sulamadan kaçınılmalı
- Hastalıklı bitki artıkları ve fideler tarladan uzaklaştırılmalı

Kimyasal Önlemler:

- İlaçlı mücadeleye ilk belirtiler görülür görülmez başlanmalıdır
- Bitkinin tüm yüzeyi ilaçlanmalı, ilaçlama serin ve rüzgârsız zamanlarda
- 7–10 gün arayla yapılmalıdır.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
		100 l suya	Dekara	
Azoxystrobin 250g/l	SC	75ml (Açıkta Yetiştirilen Domates)		3
Bacillus subtilis % 1.34 QST 713 ırkı	SC		1400ml (Sera)	-
Bakır kalsiyum oksiklorit % 16	WP	1000g		14
Bakır kompleksi +Mancozeb %21+%20	WP	300g		7
Bakır hidroksit %50	WP		250g	7
Bakır oksiklorit 357.5g/l	SC	420 ml		14
Bakır oksiklorit 700 g/l	FL	175 ml		14
Bakır Hidroksit % 53,8	DF	200 gr.		14
Bakır oksiklorit %50	WP	500g		14
Bakır oksiklorit +Maneb %37.5+%20	WP	300g		7
Bazik bakır sülfat 193g/l	SC	500ml		21
Bazik bakır sülfat %52.5	WP	400g		14
Captan 500g/l	FL	300ml		3
Captan % 80	WDG	185 g		7
Chlorothalonil + Bakiroksiklorit %25+%25	WP	300g		14
Chlorothalonil + Bakiroksiklorit 317+317g/l	SC	250ml		14
Cymoxanil+Bakır %4.20+%39.75	DF	200g		7
Cymoxanil+Mancozeb %5+%45	WP	300g		14
Dimethomorph+ Bakiroksiklorit %6+%40	WP	300g		7
Folpet %50	WP		300g	7
Famoxadone+Cymoxanil %22.5+%30	DF	40g (Sera)	40 g (Tarla)	3
Famoxadone+Mancozeb %6.25+%62.5	WG	80 g (sera)	80g (tarla)	3
Imazalil 500g/l	EC	30ml		3
Iprodione %50	WP	100g		7
Mancozeb %72	WP	250g		14
Mancozeb %75	WG	200g		14
Mancozeb % 80	WP	200g		28
Maneb %80	WP	200g		28
Metiram Complex %80	DF	175g		7
Propineb %70	WP	300g		7
Tebuconazole %25	WP	50g		7
Tebuconazole 250g/l	EC	50ml		7
Yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları 51.4g/l	EC		200 ml	7
Azoxystrobin 250g/l	SC	75 ml		3
Bakır Hidroksit %30	WG	150 g		3



DOMATESDE BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞI

(*Xanthomonas vesicatoria*)



Hastalık Belirtisi

- Yapraklarda ilk belirtiler küçük, şekilsiz, yağlımsı lekeler şeklindedir. İlerleyen dönemlerde lekelerin birleşmesiyle tüm yaprak kurur.
- Erken dönemde hastalık görülürse fide ve genç bitkiler tamamen kavrulur.
- Yaprak sapı, sap ve meyve sapında yaprak belirtilerine benzer yağlı görünüşte lekeler oluşur.
- Meyvelerde ise başlangıçta küçük, zamanla büyü-yen, hafifçe çukur, ortası çatlayan lekeler oluşur ve zamanla bu lekeler meyveyi tümünden çürütebilir.
- Hastalığı oluşturan etmen tohumla da taşınabilen bir bakteridir.
- Hastalıklı bitki artıklarıyla toprağa geçip toprağı da bulaştırabilir.
- Özellikle çiçek devresinde domates bitkilerini hastalandırıldığında önemli ürün kayıpları oluşturur.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Domates, biber, köpek üzümü

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Temiz tohumluk kullanılmalıdır.
- Fide döneminde Hastalık Belirtisi gösteren bitkiler fidelikten uzaklaştırılarak imha edilmelidir.
- Fidelik ve seralar sık sık havalandırılmalıdır.
- Hastalığın görüldüğü seralarda 2–3 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

Kimyasal Mücadele

- Fidelikte ve serada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak yeşil aksam ilaçlaması yapılmalıdır. Koruyucu olarak Fide döneminde haftada bir, tarla da 8–10 gün ara ile 2–3 uygulama yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)
		100 lt suya	
Bakır oksiklorür % 50	WP/WG	300 – 400 g	14
Bakır kompleks % 21 + Mancozeb % 20	WP	300 g	7



PATLICANGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI

(*Leveillula taurica*)



Hastalık Belirtisi

- Konukçuların yapraklarında önce yuvarlakça ayrı ayrı lekecikler görülür.
- Daha sonra bu lekecikler birleşerek bütün yaprak sapını, yaprak ayasını, gövdeyi kaplar.

- Hastalığın biraz daha ilerlemesi ile yapraklar pörsür, aşağıya doğru sarkar.
- Mevsim ilerledikçe lekelerin rengi beyazdan kül rengine döner.
- Hastalık ilerledikçe kurumalar meydana gelir ve bu şekilde de büyük ölçüde ürün kayıpları ortaya çıkar.

Konukçuları

- Biber, patlıcan, patates ve domateste görülür.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Hastalıklı bitki artıkları toplanıp yakılmalı veya derine gömülmelidir.

Kimyasal Mücadele

- İlaçlamalar tarla ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.
- Kimyasal mücadelesinde Bakanlığımızca ruhsatlı, aşağıda belirtilen aktif maddeli ilaçlar reçeteli olarak kullanılmalıdır.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)
		100 l suya	Dekara	
Basillus subtilis % 1.34 QST 713 ırkı	SC		1400 ml (Sera)	-
Kükürt 800 g/l	SC	400 ml (Sera)		7
Kükürt 700 g/l	SC	200 ml (Sera)		7
Kükürt % 80	WP	400 g		7
Penconazole 100 g/l	EC	50 ml (Sera)		7
Triadimenol+Folpet %1.5+%70	WP	200 g		7
Diniconazole 50 g/l	EC	30 ml (Sera)		3
Triadimenol 50g/l	EW	100 ml(Sera)		7
Triadimenol 250 g/l	EC	40 ml(sera)		3
Boscalid+Pyraclostrobin %26,7+%6,7	WG	60 g/100 lt (sera)		3
Dinocap 475 g/l	SC	60 ml (patıcan)		7
Kresoxim M. 100 g/l+Boscalid 200 g/l	SC	50 ml(sera)		
%15 Triflumizole+ %3,4 Cyflufenamid	WG	25 g		
Azoxystrobin + 125g/l Difenconazole 200g/l		100 ml (domates-sera)		3
%58,5x10 ⁹ fu/ml Ampolomyces quisqualis isolat M-10		5 g domates-sera)		-
Tetraconazole 100g/l	EC	50 ml		3

AB'ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı



SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK

(*Sclerotinia sclerotiorum*)



Hastalık Belirtisi

- Hastalık bitkilerin fide devresinde kök çürüklüğüne neden olur.
- Daha ileri devredeki bitkilerde kök, gövde, yaprak ve meyvelerde çürümelere neden olur.
- Gelişmiş bitkilerde belirtiler önce kök boğazı ve toprağa yakın olan alt yapraklarda ortaya çıkar.
- Hastalığın ilerlemesi ile kök boğazında veya gövde kısmında bol miktarda ve pamuk beyazlığında bir misel tabakası oluşur.

• Zamanla yumaklar şeklinde toplanan misel tabakaları önceleri kirli beyaz renkte ve yapışkan bir halde iken daha sonra havanın etkisi ile koyu kahverengiden siyaha kadar değişen renkler alarak sert bir yapıya dönüşürler

- Bu yapılar önce beyaz, sonra pembe, daha sonra da sert ve siyahtır.
- Bazı bitkilerde yaprak diplerinde (marul), bazılarında ise gövdenin öz kısmında (lahana, havuç, domates, ayçiçeği) bulunurlar.
- Bu yapılar bulaşmış oldukları toprakta uzun yıllar kalabilir ve yıldan yıla bitkileri hastalandırmayı sürdürürler.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

• Bu etmen sebzelerin çoğunda hastalık oluşturabilir. Başlıca konukçuları lahana, karnabahar, hıyar, havuç, salata, marul, kavun, karpuz, biber, patlıcan, domates, fasulye, kereviz sayılabilir..

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Hastalık su tutan, çok rutubetli yerlerde geliştiği için böyle yerlerde drenaj ile toprak suyunun fazlalığını akıtmak gerekir.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Temiz tohumluk kullanılmalıdır.
- Bulaşık alanlarda uzun yıllar münavebe uygulanmalıdır.
- Hasattan sonra kalan artıklar temizlenmeli, toplanıp yakılmalıdır.
- Seralarda sıcaklık ve nem kontrol altında tutulmalı, havalandırma sistemini devreye sokarak sera nemi azaltılmalıdır.
- Ürünlerin depoda zarar görmesini önlemek için depoya alınan ürünün ıslak olmamasına özen gösterilmeli ve depo nemi hastalığın gelişme gösteremeyeceği oranda tutulmalıdır.

- **Kimyasal Mücadele**

Bulaşık olduğu bilinen alanda toprak ilaçlaması dikimden önce, yeşil aksam ilaçlaması ise fidelerin şaşırtılmasından sonra başlanılmalıdır.



SEBZE FİDELERİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (ÇÖKERTEN) HASTALIĞI

(*Phythium spp.*, *Rhizoctonia spp.*, *Fusarium spp.*,
Alternaria spp., *Sclerotinia spp.*)



Hastalık Belirtisi

- Hastalık fide devresinde görülür. Aynı zamanda çıkıştan öncede zarar meydana gelebilir
- Fidelik devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından itibaren yattıkları görülür
- Gerek çıkış öncesi, gerek çıkış sonrası meydana gelen ölümler sonrası fidelikte ocaklar halinde ölümler sonucu ocaklar halinde boşluklar meydana gelir
- Fidelik koşulları uygun olduğu takdirde, hastalık, fidelerin tamamen tahrip olmasına sebep olabilir
- Hastalık yurdumuzda fide üretilen bütün alanlara yayılmış durumdadır

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Fide kök çürüklüğü hastalığı tüm sebze çeşitlerinin fidelik devresinde zararlıdır.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Zarar gören fidelerin harç toprağı boşaltılıp içerisi temizlendikten sonra yeniden fidelik toprağı hazırlanıp konulmalı
- Tohum ekimi sık olmamalı
- Hastalıklı fideler ayıklanmalı
- Fideler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalı



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Fazla sulamadan kaçınılmalı
- Gereksiz yere fazla azotlu gübre kullanılmamalı
- Erken ekim yapmaktan kaçınılmalı
- Fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgârları tutmayan yerlerde kurulmalıdır

Kimyasal Mücadele

- İlaçlamalar, tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması ve fidelerin toprak yüzeyine çıkışından sonra yapılabilir.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
		100 l suya	Dekara	
Bakır oksiklorid %50	WP	300-500g (fidelik ilaçlaması)		14
Bordo bulamacıBakır sülfat	Suda çözünen kristal	500+1000g (fidelik ilaçlaması)		14
Captan %50	WP	200-250g (fidelik ilaçlaması)		7
Hymexazol 360 g/l	SC	150 ml	3 lt ilaçlı su m ² ye	7
Mancozeb % 80	WP		200 g/ 100 kg tohum	-
Maneb % 80	WP	200-250 g (fidelik ilaçlaması)	200 g/ 100 kg tohum	28 -
Propineb % 70	WP	200-250 g (fidelik ilaçlaması)		7
Trichoderma harzianum AGZ 400	WP		7,5 g/ 1 kg tohuma (Domates)	-
Trichoderma harzianum 1x10	WP		10 g/m2 Fidesiz Toprağa)	-
Thiram % 80			200 g/100 kg tohuma	14
Tolclofos Methyl % 50	WP	100 g/100 lt su toprak ve bitki ilaçlaması, can suyu uygulaması	1000 g/da toprak ve bitki ilaçlaması, can suyu uygulaması	-
Tolclofos Methyl + Thiram % 300 + 300	WP		400 g/da Damlama Sulamayla -Sera)	3
Streptomices lydicus WYEC 108 % 0,0371	SP	Fidelik 3 gr/ m ²		-
Promocarb+Fosetyl/ 530 gr/l + 310 / 1,5 lt	SL	4 ml/ m ² (Sera)		3
10 8 cfu/g Tricoderma aspersellum ırk 012, Tricoderma gamsii ırk 080			250 g	



DOMATES GÜVESİ

(*Tuta absoluta*)



Tanımı ve yaşayışı

- Ergin ince uzun vücutlu , 6-7 mm boydadır. Kanat açıklığı 10 mm'dir. Antenleri iplik şeklindedir. Grimsi kahverengi olan ön kanatları üzerinde irili ufaklı siyah noktalar bulunur .
- Yumurta: 0.4 mm uzunluğunda,0.2 mm genişliğinde silindirik, sarı renklidir.
- Yumurtadan çıkan larvanın vücudu krem renkli, başı siyahtır.
- Dört larva dönemi geçirir.
- Olgunlaşan larvanın vücudu yeşile, başı kahverengiye döner.
- Larvanın başının arkasında bulunan koyu renkli bant ayırt edici en önemli özelliğidir.
- Larva dönemi 13-15 gün sürer. Dördüncü döneme doğru larvanın vücudunun üstü pembeleşir.
- Pupa açık kahverenkli, 6 mm uzunluğundadır
- Pupa dönemi 9-11 gün sürer.
- Erginler geceleri aktiftir, gündüzleri yaprakların arasında saklanırlar.
- Yumurtalarını yaprak, tomurcuk, meyve, sap ve gövdeye bırakırlar.
- Bir dişi yaşam süresince 120-260 adet yumurta bırakabilir.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Toprakta ya da yaprakta açılan galerilerin içinde pupa olur.
- Çevre koşullarına bağlı olarak bir dölünü 29-38 günde tamamlar. Kışı yumurta, pupa veya ergin olarak geçirir. Zararlı, koşullar uygun olduğu sürece yılda 10-12 döl vermektedir.



Zarar şekli

- Yumurtadan çıkan larva, bitkinin büyüme uçlarında, yaprak, meyve, sap ve gövdede galeriler açarak beslenir. Yaprakta açtığı galeriler, geniş şeffaf boşluklar şeklindedir. Bu galeriler daha sonra kahverengiye dönüşerek kurur.
- Yaprakta ve meyvede açılan galerilerde zararlının siyah renkteki pislikleri dikkat çekicidir . Larvanın meyvede açtığı galerilerin görüntüsü düzensizdir, galeriler meyvenin her tarafında görülebilir.
- Domates meyvesinin her döneminde zarar yapabilir. Meyvede açılan galerilere mikroorganizmaların yerleşmesiyle çürümeler meydana gelir. Domates Güvesi zararı bazen patates güvesi ile çoğunlukla yeşilkurt zararı ile karıştırılmaktadır. Zarar şekli kabaca benzerlikler gösterse de kolaylıkla birbirinden farklı olduğu anlaşılabacaktır.
- Çiftçilerimiz yeşilkurt zararını çoğu zaman önemsemediğinden mücadele yapmamakta, zarar birbirine karıştırdığından fark edilebilir seviyeye ulaştığında mücadele iyice zorlaşmaktadır. Yeşilkurt domates güvesine göre daha iri yapılı olup, meyve üzerinde meydana getirdiği zarar büyük yenikler şeklinde belirgin olup açtığı delikler daha büyüktür.



Domates Güvesi
İkincil Zarar



Yeşilkurt Zararı



Domates Güvesi zararı ise kabuk altına yakın etli kısımda beslenmekte ve açtığı delikler daha küçük çaplıdır.

- Daha çok olgunlaşmamış domates meyvelerini tercih eder. Yoğun popülasyonlarda domatesteste % 100'lere varan ürün kayıplarına neden olabilir.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Ana konukçusu domatestir. Domates güvesinin beslenmede tercih ettiği bitki domatestir. Patlıcangiller familyası bitkilerinden patates, patlıcan, biber, pepino ile bazı çiçeklerde de beslenebilir. Ayrıca yabancı patlıcangillerden it üzümü ve şeytan elması isimli pıtrakta da beslenir.

Bulaşma Yolları

- Zararlı, bulaşık domates meyveleri, domates fideleri, taşıma materyalleri (kasa, kutu vb) ve nakliye araçları ile taşınabilir.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Fidelerin zararlı ile bulaşık olmamasına özen gösterilmeli,
- Zararlı ile bulaşık yaprak, meyve ve bitkilerin üretim alanından uzaklaştırılıp imha edilmeli.
- Üretim alanı ve çevresinde zararlıya konukçuluk edebilecek yabancıotlarla mücadele edilmeli,
- Hasat sonrası tarlada kalan zararlı ile bulaşık bitki artıkları imha edilmeli,
- Ürün münavebesi (Solanaceae familyasına bağlı olmayan ürünlerin yetiştirilmesi),
- Hasattan sonra derin sürüm yapılmalı,
- Yetiştirme tekniğine uygun gübreleme ve Sulama yapılmalı,
- Seradaki giriş ve havalandırma açıklıkları zararlının giremeyeceği incelikteki tül ile kapatılmalıdır.

Biyolojik Mücadele

Zararlının *Trichogramma pretiosum* Riley, *Podisus nigrispinus*

Nesidiocorus tenuis, *Macrophus caliginosus* doğal düşmanları arasındadır.

- Bu etmenler biyolojik mücadelede etkilidir.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

Biyoteknik yöntemler

- İzleme ve kitlesel tuzaklama amacıyla feromon tuzaklar kullanılmaktadır.

Feromon	Kullanım Şekli
Qlure - TUA (Domates Sera)	1 Adet İzleme Amaçlı Tuzak/ha
Biyocill (Domates Sera)	1 Adet İzleme Amaçlı /da

Kimyasal Mücadele

• Kimyasal mücadelede domates güvesinin ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada ve serada eşeysel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk kelebek görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta ve tırtıl aranır. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve tırtıl ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir.

• İlaçlamadan 5 ila 6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Bitkinin her tarafı ilaçla kaplanacak şekilde uygulama yapılır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Doz 100 l su	Dekara	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
Azadiractin, 10 g/l	EC	300 ml		3
Chlorantraniliprole + Abamectin 45g/l/+18g/l	SC	80ml(sera)		3
Metaflumizone 240g/l	SC		100 ml (seratarla)	3
Spinosad 480 SC	SC	25 ml		3



SEBZELERDE BEYAZ SİNEK

Tütün Beyaz Sineği (*Bemisia tabaci*)

Sera beyazsineği (*Trialeurodes vaporariorum*)



Tanımı ve Yaşayışı

- Erginleri 1 mm boyunda beyaz renktedir.
- Larvaları 0.3-0.7 mm boyundadır.
- Erginler bitkinin büyüme noktalarında ve taze yapraklarda larvalar yaprağın alt yüzünde bulunurlar.
- Yumurtadan çıkan larva çok hareketlidir.
- Kısa bir süre sonra hareketsiz bir devreye girer ve ergin oluncaya kadar hareketsiz dönemi devam eder.
- Seralarda mevsim boyunca görülebilirler.
- Yılda 9-15 döl verirler.

Zarar Şekli

- Larva ve erginler bitki özsuynunu emerek beslenirler.

- Emgi sonucu yaprakta sararma meydana gelir.
- Zararlı beslenme sırasında tatlı bir madde salgıladığından yapraklar üzerinde siyah bir tabaka oluşur ve bu kısımlar özümleme yapamaz.
- Bu nedenle bitki zayıflar verim ve kalite düşer.
- Bitkilerdeki azot miktarının azalmasına neden olurlar. Bu durum bitki büyümesini olumsuz yönde etkiler.
- Virüs hastalıklarını taşırlar.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- En uygun konukçusu domates, patlıcan, hıyar olup; biber, kabak, kavun, fasulye gibi sebzelerde, tütün, pamuk ve süs bitkilerinde zarar yapar. Ayrıca bamy, fasulye, patlıcan, patates, domates, biber, kabak, hıyar, marul ve lahana beyazsineğin zararlı olduğu bitkiler arasındadır.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Beyazsinek kışı yabancıotlar üzerinde geçirmektedir. Bu nedenle hasattan sonra tarla ve sera çevresindeki yabancıotlar doğal düşmanlar açısından incelenerek buna göre uygulama yapılmalıdır.
- Yeterince sulama ve gübreleme yapılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Seralardaki giriş-çıkış ve havalandırma yerleri erginlerin girmesini önlemek amacı ile ince tel veya tül ile kaplanmalı, nem ve sıcaklık artışını önlemek için yeterli havalandırma yapılmalıdır.

Biyoteknik Mücadele:

- Seraya fide dikimi ile birlikte ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara 1 adet sarı yapışkan tuzak bitkinin 10-15 cm üzerinden asılır.
- İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra ise 10 m²'ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla ardışık olarak, tuzaklar aynı şekilde yerleştirilir.
- Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile değiştirilir.

Kimyasal Mücadele

- Yaprak başına 5 adet larva +pupa olduğunda ilaçlama yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre (gün)
		Dekara	100 l suya	
Acetamiprid %20	SP	30 g (tarla)	30 g (sera)	3
Buprofezin 400g/l	SC		100 ml(Sera)	7
Chlorpyrifos ethyl 480 g/l	EC	200 ml		7
Cypermethrin 200 g/l	EC	40 ml		7
Cypermethrin 250 g/l	EC	30 ml		7
Deltamethrin 25 g/l	EC	100 ml		3
Imidacloprid 350g/l	SC	100 ml (serada damla sulama)		7
Lambda cyhalothrin+ Buprofezin 20+100 g/l	EC	300 ml		7
Pirimiphos-methyl, 500 g/l	EC	200 ml		3
Pyridaben %20	WP		100 g	3
Pyriproxyfen 50g/l	EC		100 ml (örtüaltı)	1
Thiamethoxam, 240 g/l	SC	100 ml (serada damla sulama)		7
Pymetrozine %50	WG	30 g/l	-	3
Beauveria Bassiana	SC		125 ml	-
Pyroxyfen 100g/l	EC		50 ml (sera)	1
Sarı renkli yapışkan tuzak (10x20 cm)		Domates-sera beyaz sinek monitor 1 tuzak/50m2)		
%7,16 Beauveria bassiane ATCC 74040 Irkı			125ml	-



DOMATES PAS AKARI

(*Aculops lycopersici*)



Tanımı ve Yaşayışı

- Domates pas akarı sarımsı beyaz renkte, hafif kambur, ince uzun, iğ şeklindedir. Dişiler 140-180 mikron boyundadır. Gözle görülmezler.

- Kışı, tarladaki bitki artıkları arasında geçirir. Sıcaklığın yüksek ve orantılı nemin düşük olması zararının çoğalmasını hızlandırır.

- İlk önce bitkinin yere yakın gövdesinde, daha sonra yapraklarda ve meyvede görülürler.

- Zararlı yaz boyunca üremeye devam ederek çok sayıda döl verir.

Zarar Şekli

- Bitkinin öz suyu ile beslenirler.
- Önce bitki gövde ve meyvelerinde yağimsı, bronz bir renk değişimi görülür.
- Zarar gören gövde ve yaprakların rengi parlak kahverengi veya kıızılımsıdır .
- Alt yapraklarda kuruma olur. Yapraklar kavrulmuş gibi sert ve gevrektiler.
- Gövde üzerinde çatlamalar olur ve büyüme durur.
- Meyvelerin üzeri sertleşir ve çatlar.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Domates, biber, patlıcan, patates gibi sebzelerin yanında tütün, süs bitkilerinden petunya ve bazı yabancıotlarda zararlıdır.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Zararlıının beslendiği bitkilerin bulunduğu alanlara yakın yerlerde fide yetiştirilmemelidir.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Hasattan sonra derin sürüm yapılmalı, bitki artıkları tarlalardan uzaklaştırılmalıdır.
- Domates tarlalarını çevreleyen alanlarda yabancı otlar imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele İlk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz	Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre (gün)
		100 l suya	
Pyridaben, %20	WP	75 g (sera)	3



KIRMIZIÖRÜMCEKLER

İki noktalı kırmızıörümcek (*Tetranychus urticae*)
Pamuk kırmızıörümceği (*Tetranychus cinnabarinus*)



Tanımı ve Yaşayışı

- Erginler 0.5-0.7 mm boyunda, oval şekilde olup, gözle zor fark edilirler.
- Yaprığın alt yüzünde ördükleri ipek ağlar arasında ergin, larva, nimf ve yumurtaları bir arada görülür .
- Kışı ılık geçen bölgelerde yaz aylarında olduğu gibi yaşayıp üremelerine devam ederler.
- Tarla kenarı ve içindeki yabancıotlardan ve bulaşık fidelerden sebzelere geçerler.
- Yılda 10-12 döl verirler.

Zarar Şekli

- Kırmızıörümcekler bitkilerin özsuyunu emerek beslenirler.
- Bitki özsuyu emilen yaprak sararır.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Yapraklar kıvrılır, dökülür.
- Verim %40-60 oranında düşer ve ürün kalitesiz olur.
- Çeşitli virüs hastalıklarının yayılmasına neden olurlar.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Domates, kavun, karpuz, hıyar, kabak, patlıcan, fasulye ve börülcede zararlıdır.
- Birçok yabancıot türü de konukçusudur.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Seraya temiz fideler dikilmeli,
- Hasattan sonra bitki artıkları tarla ve seradan uzaklaştırılmalı,
- Ot çapasına önem verilmeli,
- Gereğinden fazla azotlu gübreler kullanılmamalı,
- Toprak işleme yapılarak kırmızıörümceklerin kışladıkları bitki artıkları toprağa gömülmelidir.

Kimyasal Mücadele

- Küçük yapraklı sebzelerde yaprak başına 3 adet, büyük yapraklı sebzelerde 5 adet canlı Kırmızıörümcek bulunduğunda ilaçlama yapılır.



Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre (gün)
		Dekara	100 l suya	
Abamectin 18 g/l	EC	25 ml		3
***Bifenthrin 100 g/l	EC		70 ml (Patlıcan)	7
Clofentezine 500 g/l	SC		30 ml	3
Cyenoptyrafen 314.4g/l			80 ml	2
Etoazole 110 g/l	SC		35 ml	3
* Fenazaquin 200 g/l	SC		50 ml	3
* Fenpyroximate 50 g/l	EC		75 ml	14
***Malathion, 190 g/l	EC		300 ml	7
***Malathion, 500g/l	EC		100 ml	7
***Malathion, 650g/l	EC		90 ml	7
Milbemectin 9,3g/l	EC		100 ml(Sera)	1
* Propargite 588 g/l	EC	175 ml		14
* Propargite 790 g/l	EC		75 ml	3
Pyrimidifen 104 g/l	SC		30 ml	7
Spiromesifen 240 g/l	SC		50 ml	3

AB'ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı

* Spesifik akarisit olup, sadece Kırmızıörümcek sorunu olan yerlerde kullanılır.

** Akarisit+ Fungisit olup, Kırmızıörümceklerle birlikte küleme sorunu olan yerlerde kullanılır.

*** İnsektisit+Akarisit olup, aynı anda Kırmızıörümcek ve böcek zararı olan yerlerde kullanılır.



SEBZELERDE THRİPSLER

Tütün thrips (Thrips tabaci)

Çiçek thrips (Frankliniella occidentalis)



Tanımı ve Yaşayışı

- Ergini yaklaşık 1 mm boyunda sarı renkte ve çok hareketlidir.
- Ergin ve larvalar yaprakların alt yüzünde birlikte bulunurlar.
- Sıcak bölgelerde konukçu bitki buldukları sürece üremelerine devam ederler.

- Yılda 3-6, en fazla 10 döl verirler.

Zarar Şekli

- Ergin ve nimfler bitkilerin yaprak, sap ve meyvelerinde bitki özsuğu ile beslenirler.
- Beslendiği yapraklar bir süre sonra beyazımsı veya gümüş rengini alır
- Kurak geçen yerlerde zararı daha da fazladır.
- Virüs hastalıklarını taşır ve sağlıklı bitkilere bulaştırırlar.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Soğan, pırasa, sarımsak, domates, kabak, kavun, karpuz, fasulye, patlıcan, ıspanak, bezelye, yerelması ve patatestede zarar yaparlar.

Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler

- Zararlı ile bulaşık bitki artıkları imha edilmelidir.
- Toprak işleme ve yabancıot mücadelesi yapılmalıdır.
- Seralarda küçük delikli tül ile havalandırma açıklıkları kapatılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

- Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 adet, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet Thrips olduğunda ilaçlama yapılır.
- Domates tarımı yapılan yerlerde özellikle seracılıkta, Domates Lekeli Solgunluk virüsü var ise ekonomik eşik dikkate alınmadan trips bulaşmasını önlemek üzere mücadele yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre (gün)
		Dekara	100 l suya	
Deltamethrin, 25 g/l	EC	50 ml		3
Pirimicarb, % 50	WP		50 g	7



SEBZELERDE YAPRAKBİTLERİ

Pamuk yaprakbiti (*Aphis gossypii*), **Bakla yaprakbiti** (*Aphis fabae*), **Şeftali yaprakbiti** (*Myzus persicae*) **Patates yaprakbiti** (*Macrosiphum euphorbiae*) **Lahana yaprakbiti** (*Brevicoryne brassicae*)



Tanımı ve Yaşayışı

- Vücutları oval biçimde ve yumuşak olup, 1.5-3.0 mm boyunda yeşil, sarı, siyah renklindedir.
- Ergin ve nimfleri bitkilerin taze sürgün, yaprak ve yaprak altlarında toplu halde bulunur.
- Yaşayışlarına göre tek ve iki konukçulu türler olarak iki gruba ayrılırlar.
- Bölgelere ve türlere göre yılda 10-16 döl verirler.

Zarar Şekli

- Bitki özsuyunu emerek beslenirler.
- Beslendikleri yapraklarda ve taze sürgünlerde kıvrılmalar ve şekil bozuklukları oluşur.
- Salgıladıkları tatlı madde yaprağı kaplar, üzerinde mantarlar gelişerek yaprak kararır.
- Bitkilerde verim azalır ve kalite bozulur.
- Virüs hastalıklarını taşır ve sağlıklı bitkilere bulaştırırlar.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Ispanak, lahana, kıvırcık salata, kabak, karpuz, acur, hıyar, domates, patlıcan, bamya, sarımsak, karnabahar, patates ve kuşkonmazda zarar yaparlar.



Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler

- Hasattan sonra toprak üstünde kalan bitki sapları ve yabancıotlar imha edilmelidir.
- Seralarda havalandırma iyi bir şekilde yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

- Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 adet, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ve daha fazla Yaprakbiti olduğunda ilaçlama yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre (gün)
		Dekara	100 l suya	
Azadiractin, 10 g/l	EC		500 ml	3
Beta-cyfluthrin, 25g/l	EC		50 ml	14
Chlorpyrifos-methyl, 227 g/l	EC	375 ml		7
Clothianidin, % 50	WG	9 g		1
Cyfluthrin 50 g/l	EC		50 ml	14
Deltamethrin, 25 g/l	EC	50 ml		3
Imidacloprid, 350 g/l	SC		20 ml	7
Malathion, 190 g/l	EC	400 ml		7
Malathion, 500 g/l	EC		150 ml	7
Pirimicarb, % 50	WG		50 g	7
Pirimicarb % 25	WG	100 g		7
Pirimiphos-methyl 500 g/l	EC		100 ml	3
Pymetrozine %25	WP		40 g	3
Pymetrozine %50	WG	30 g (tarla)		3
Tau-fluvalinate 240 g/l	FL	20 ml (tarla-Sera)		3
Thiamethoxam 240 g/l	SC	15 ml (tarla)		7



YAPRAK GALERİ SİNEKLERİ

(*Liriomyza trifolii*, *L. bryoniae*, *L. huidobrensis*,
Phytomyza horticola)



Yaprak galeri sineği ergini



Yaprak galeri sineğinin zararı

Tanımı ve Yaşayışı

- Erginleri 1-2 mm boyunda gri-siyah renktedir.
- Larvaları en fazla 3 mm boyunda beyaz-sarı renkte ve şeffaftır.
- Erginleri bitkinin tüm yapraklarında, larvaları galeri içinde bulunur.
- Sera koşullarında bütün mevsim boyunca, yazın yabancıotlar ve sebzeler üzerinde görülürler.
- Sera koşullarında 10 döl verirler.

Zarar Şekli

- Dişiler yapraklarda küçük yaralar açar, buradan çıkan özsu ile beslenir ve hücre bozulmasına neden olurlar.
- Bu beslenme delikleri sarararak küçük

lekeler meydana getirir.

- Larvalar yaprakların iki zarı arasında kalan etli doku ile beslenir ve galeri oluştururlar.
- Daha sonra zarar görmüş bölgeler sararıp kurur ve yapraklar dökülür.
- Genç bitki ve fidelerde gelişmeyi geciktirirler.
- Kalite ve verim kaybına neden olurlar.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Domates, patlıcan, biber, fasulye, bezelye, bakla, marul, kabak, hıyar, ıspanak, soğan ve pırasada zararlıdırlar.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Sera içi, çevresi ve fide yastıklarının çevresi yabancıotlardan temizlenmelidir.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Havalandırma açıklıkları ince tel ile kaplanmalıdır.
- Bulaşık bitki artıkları imha edilmeli ve bulaşık fideler seraya dikilmemelidir.
- Toprak 10 cm derinliğinde sürülerek topraktaki pupalar yok edilmelidir.
- Malçlama yapılarak toprağın nemli kalması ve pupaların nemden çürümesi sağlanmalıdır.

Biyoteknik Mücadele

- Seraya fide dikimiyle birlikte, ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara 1 adet tuzak asılır. İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra, toplu tuzaklama amacıyla sarı yapışkan tuzaklar, sera içerisinde 10 m²'ye bir tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla alması olarak yerleştirilir. Tuzaklar bitkilerin 10-15 cm üzerine asılmalıdır. Tuzakların üzeri kirlendikçe (tuzağın yapışkanı kuruyunca veya sarı rengini kaybedince) tuzakların yerine yenisi asılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

- Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4 adet, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 adet larva olduğunda ilaçlama yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre (gün)
		Dekara	100 l suya	
Thiocyclamhydrogen oxalate, %50	SP		50 g	3



SEBZELERDE YEŞİLKURT

[*Heliothis armigera*, *Heliothis virescens* (= *Heliothis dipsacea*)]



Tanımı ve Yaşayışı

- Kelebeklerin kanat açıklığı 35-40 mm, bej-kahverengi veya yeşilimsi renktedir.
- Larvaları 15-45 mm boyunda, kirli beyaz renkte ve üzeri kıllıdır.
- Olgun larvanın vücudunun sırt kısmında yeşil kahverengi ve sarı renkte bantlar, yanlarda da sarı renkli birer bant bulunur.
- Kelebekleri gündüz kuytu yerlerde saklanır, genellikle akşam üzeri uçuşurlar.
- Larvaları bitkilerin yaprak, meyve ve taze sürgünlerinde görülür.
- *H. virescens* yılda 1, *H. armigera* yılda 3-5 döl verirler.

Zarar Şekli

- Larvalar önce yapraklarda beslenir ve yenik kısımlar sararır ve kurur.
- Daha sonra sebzelerin meyvelerini delerek içine girer ve orada beslenirler. Bunun sonucunda meyveler çürür.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Domates, biber, patlıcan, bamyas ve fasulyede zararlıdır.

Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler

- Tarla ve çevresinde yabancıot temizliği yapılmalıdır. Hasattan sonra derin sürüm yapılmalıdır.
- İlk yeşil meyveler oluştuğunda larva giriş deliği olan meyveler toplanıp imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele

- Bitkilerde %5 bulaşma olduğunda ilaçlama yapılır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz		Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre (gün)
		Dekara	100 l suya	
Alphacypermethrin, 100 g/l	EC	50 ml		14
Bacillus thuringiensis berliner var. Kurstaki(32000 IU/mg)	WG		100 IU/100g	-



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

Bacillus thuringiensis berliner var. Kurstaki(24000 IU/mg)	SC		300 ml.	-
Bifenthrin, 100 g/l	EC	50 ml		7
Chlorpyrifos-ethyl, 480 g/l	EC	180 ml		7
Cyfluthrin, 50 g/l	EC	50 ml		14
Cypermethrin, 200 g/l	EC	30 ml		7
Cypermethrin, 250 g/l	EC	30 ml		7
Chlorantraniliprole % 35	WG	12 g		1
Chlorantraniliprole+ Abamectin 45+18	SC	90 ml(sera)		3
Deltamethrin, 25 g/l	EC	50 ml		3
Emamectin-benzoate, %5	SG		30 g –sera- tarla	7
Esfenvalerate, 200 g/l	EC	60 ml		7
Indoxacarb 150 g/l	SC	40 ml		3
Lambda cyhalothrin 50 g/l	EC	50 ml		3
Malathion, 190 g/l	EC	600 ml		7
Malathion, % 25	WP	500 g		7
Malathion, 650 g/l	EC	200 ml		7
Novaluron 100g/l	SC	60 ml	-	5
Metaflumizone 240 g/l	SC	100 ml		3
Pyridalyl 500 g/l	EC	20 ml	25 ml (sera)	3
Zetacypermethrin 100 g/l	EW	50 ml		7
Bacillus thuringiensis var aizawai GC-91 ırkı delta endotoksin %50 (1x10 10 cfu/g)		120 g		-
32000 CLU/mg Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 ırkı	DF		100 g(sera)	-
Bacillus thuringiensis var.kurstaki (serotypeH3a3b3c) >1x108 CFU/g)			Domates- sera yeşilkurt 100g/100lt. su+100lt. suya 1000g toz şeker ilavesi	

■ AB'ye ihraç edilecek ürünlerde kullanılmamalı



SEBZELERDE DANABURNU

(*Gryllotalpa gryllotalpa*)



Danaburnu ergini



Danaburnu ergini, larvası ve zarar şekli

Tanımı ve Yaşayışı

- Danaburnu erginleri 6-7 cm boyunda, açık veya koyu kahverengi ve oldukça iri böceklerdir. Baş ileri uzamıştır.
- Danaburnu yaşamının çoğunu toprak altında geçirir.
- Genellikle yaşama yeri olarak, galeri açmaya uygun olan kültüre alınmış; nemli, bol humuslu, killi-kumlu toprakları seçerler.
- Geceleri ve çok bulutlu günlerde faaliyet gösterirler.

Zarar Şekli

- Ergin ve nimfleri toprak içinde galeri açarak ilerlerken rastladıkları tohum, kök, yumru gibi her tür bitkisel materyali kemirerek zarar verirler.
- Özellikle yeni dikilmiş veya yeni çimlenmiş sebze fidelerinin köklerini keserek kurumalarına neden olur ve yumrulu sebzelerin de yumrularını kemirirler.
- Ülkemizin her tarafında yaygındır.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Çok sayıda bitkide zarar yapmaktadır. En çok sebzeler, çeltik, buğday, mısır, ayçiçeği, tütün, pamuk, süs bitkileri, meyve ve orman fidanlarında zarar yapar.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Toprağın zamanında ve iyi şekilde işlenmesiyle de zararlının toprak altında bulunan yaşam ortamları bozularak açığa çıkan yumurta, nimf ve erginlerinin sıcak ve doğal düşmanlar tarafından imhası sağlanmış olmaktadır.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

- Zararlıının, gübrelili ve sıcak toprakları sevmesinden hareketle, bahçelerin uygun yerlerine yaz sonuna doğru yanmamış çiftlik gübresi kümeleri bırakılarak ilkbaharda burada toplanan nimf ve erginlerin öldürülmesi popülasyonu azaltma bakımından oldukça yararlıdır.

Kimyasal Mücadele

- Bulundukları yerde mutlaka zarar yapmaları nedeniyle yoğunluklarına bakılmaksızın mücadeleye geçilmelidir.
- Bir yerde bulunup bulunmadıkları; yenik bitki, açtıkları galeri, nemli toprakların 1 cm altındaki yüzeysel kazı izlerinin incelenmesi ile anlaşılabilir.
- Ülkemizin değişik bölgelerinde erken ilkbahardan ekim ayı sonuna kadar mücadele yapılabilir.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozlar

Etkili madde adı ve oranı	Formülasyonu	Doz	Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre (gün)
		10 kg kepek+ 500 g şeker	
Chlorpyrifos-ethyl%25	WP	400 g	-



SEBZELERDE TELKURDU

(*Agriotes spp.*)



Telkurdu ergini



Telkurdu larvası

Tanımı ve Yaşayışı

- Türler'e göre değişmekle birlikte, erginlerin renkleri genellikle grimsi veya kahverengimsi siyahtır.
- Erginler sırtüstü çevrildiklerinde sıçrayıp ters dönerler ve bu sırada "çıt" diye ses çıkarırlar.
- Larva uzun silindirik şeklinde, sert vücutlu ve parlak görünümde, kahverenginde veya kiremit rengindedir.
- Olgun larva 2-3 cm boyundadır.
- Kışı larva veya ergin halde toprak içinde geçirirler. İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte larvalar toprak yüzeyine yaklaşarak beslenirler.

Zarar Şekli

- Esas zararı larvalar yapar.
- Larvalar bitki köklerini kemirerek, kalın kök ve yumruların içine girerek zararlı olurlar.
- Ayrıca yaralanma yerlerinden patojen bakteri ve funguslar bitkiye girerek çürümeler meydana getirebilirler.

Zararlı Olduğu Bitkiler

- Çok sayıda bitkide zararlıdır. En çok zarar yaptığı bitkiler arasında patates, soğan, bütün sebzeler, yer fıstığı, pamuk, mısır, buğday, arpa, yulaf, şeker pancarı ve tütün sayılabilir.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler

- Yaz sonu veya sonbahar başında yapılacak toprak işleme sayesinde larvaların sıcak ve kurak şartlarda bırakılarak ölmesi sağlanabilir.
- Ekim nöbetinde, Tel kurdu bulunan tarlalarda zarardan aşırı etkilenen konukçular ekilmemelidir.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

Kimyasal Mücadele

·Ortalama olarak m²'de 6 ve daha fazla sayıda larva mevcutsa ilaçlama yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili madde adı ve oranı	Formü lasyonu	Doz		Son ilaçlama ile Hasat arasındaki süre(gün)
		Dekara	Tohuma	
Chlorpyrifos-ethyl, %25	WP	1.2 kg	12 g/1 kg tohuma	-



DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ

(Tomato Spotted Wilt Tospovirus)



Hastalık Belirtisi

- Hastalık etmeni Tospovirus grubuna dahil bir virüsdür.
- Virüs Thrips türleri ile aktif olarak taşınır.
- Domates yapraklarında bronzlaşma, kıvrılma, nekrotik çizgiler ve benekler oluşur.
- Yaprak sapı, gövde ve yeni gelişen sürgünlerde koyu kahverengi sürgünler gözlenir.
- Sürgün ucunda geriye doğru ölüm, bitkide tek yönlü bodurluk ve solgunluk tipik belirtisidir.
- Olgun meyve üzerinde açık kırmızı veya sarı alanlar görülür.
- Yapraklarda klorotik çizgili lekeler veya nekrotik noktalar görülür.
- Biberde olgun meyvede iç içe sarı halkalar görülür.
- Marulda bitkinin tek tarafında yapraklarda klorotik lekeler görülür ve renk değişimi göbeğe kadar ilerler.
- Marul bitkisinde tek taraflı gelişme geriliği olur.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

Biberlerde bitkinin tamamında bodurluk, sarma ve solgunluk görülür.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Tohum yatağı hazırlanırken alan yabancı otlardan ve süs bitkilerinde temizlenmelidir.
- Üretim alanlarında yabancı otlarla mücadele edilmelidir.
- Üretim alanında thripslerle mücadele edilmelidir.



DOMATES MOZAYİK VİRÜSÜ

(*Tomato Mosaic Tobamovirus*)



Hastalık Belirtisi

- Hastalık etmeni Tütün mozaik virüsüdür.
- Hastalıklı bitki artıkları, yabancı otlar, sigara ve tütün kırıntılarında yaşayışını sürdürebilir.
- Konukçularından mekanik olarak taşınır.
- Yapraklar üzerinde açık yeşil, sarı ve koyu yeşil renkte mozaik lekeler görülür.
- Yapraklarda kıvrılma görülür ve yapraklar esnekliğini kaybederek kırılğan bir yapı alır.
- Bitkilerde bodurluk oluşur.
- Yapraklarda mor renk oluşumu görülür.
- Yaprak ve meyvelerde uzun kahverengi çizgiler görülür.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Bütün sebzeler, tütün ve yabancı otlar etmenin konukçusudur.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Fidelikte ve tarlada şüpheli görülen bitkiler imha edilmelidir.
- Bakım işlemlerinden önce eller bol sabun ve su ile yıkanmalıdır.
- Fidelikte ve tarlada sigara ve tütün içilmemelidir.
- Tütün artıkları herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.
- Bakım işlerinde kullanılan aletler %5 lik hipolu su ile dezenfekte edilmeli.
- Hasattan sonra bitki artıkları imha edilmelidir.
- En az 2 yıllık Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
- Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.



HIYAR MOZAYİK VİRÜSÜ

(*Cucumber Mosaic Cucumovirus*)



Hastalık Belirtisi

- Hastalığın etmeni Hiyar mozaik virüsü ve bu virüsün ırklarıdır.
- Hastalıklı bitki artıklarında ve yabancı otlarda yaşamını devam ettirebilir.
- Yabancı otlar virüsü belirti göstermeden taşıyabilir.
- Etmen yabancı ot tohumları, mekanik olarak ve yaprak bitleri ile yayılır.
- Hastalığın ilk belirtisi yapraklarda damarlar arasında küçük yeşilimsi lekeler şeklinde görülür.
- Daha sonra bu lekelerin şiddetlendiği ve yayıldığı görülür.
- Bitkide bodurluk ve yapraklarında deformasyon oluşur.
- Yapraklar arasında görülen lekeler kabarcıklaşır. Benzer lekeler ve kabarcıklar meyvede de görülür.
- Bitkide kol atma yavaşlar ve meyvede şekil bozuklukları görülür.

Hastalığın Görüldüğü Bitkiler

- Hiyar, kavun, karpuz, kabak, muz, domates, biber, börülce ve mısır etmenin konukçuları arasındadır.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Hastalıklı bitkilerden tohum alınmamalıdır.
- Hastalıklı bitkiler imha edilmelidir.
- Bakım işlerinden önce eller bol sabun ve su ile yıkanmalıdır.
- Tarla yabancı otlardan temizlenmelidir.
- Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.



Domates Tarlalarında Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Kullanılan Herbisitler, Dozları ve Uygulama Şekilleri



Kırmızı Köklü
Tilki Kuyruğu



Kanyaş



Darıcan

- Canavar otlarını geniş yapraklı birçok kültür bitkisinde görmek mümkündür ancak özellikle ayçiçeği, tütün, domates, patlıcan, bezelye, mercimek, bakla, nohut ve havuçta önemli derecede zararlara neden olmaktadır. Bu yabancı otla bulaşıklık çok ağır olduğu durumlarda kültür bitkilerinde verim kaybı % 100'lere kadar çıkabilmektedir.

- Bu yabancı otla mücadelede, canavar otlarının tohumlarından ari temiz tohum kullanmalı, canavar otlarıyla bulaşık tarlada kullanılan tarımsal alet veya makinelerin, bulaşık olmayan tarlada kullanmadan önce çok iyi bir şekilde temizlenmiş olmasına özen gösterilmeli, canavar otlarıyla bulaşık tarlalarda konukçusu olmayan kültür bitkileriyle uzun süreli münavebe yapılmalı, tarla veya seralarda görülen canavar otları çiçeklenmeden önce elle çekilerek ayrı bir yerde yakılmalı veya çok derine gömülmelidir. Canavar otlarıyla mücadelede solarizasyon oldukça etkili bir yöntem olduğu için özellikle sera bitkileri yetiştiriciliğinde solarizasyon yapılmalıdır. Bu yabancı otla Kimyasal Mücadelede domateste ruhsat almış herbisit bulunmamaktadır.



Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili Madde Adı ve Oranı	Formülasyonu	Dozu (preparat) (Dekara)	AÇIKLAMALAR
Clethodim 116.2 g/l	EC	60 ml 80 ml	Domatestede çıkış sonrası yabancı otların aktif büyüme dönemlerinde kullanılır. Darıcana 60 ml, tohumdan gelen Kanyaşa 80 ml dozunda uygulanır.
Fenoxaprop-ethyl %12	EC	150–200 ml	Biber ve domateslerde kanyaş ve tek yıllık dar yapraklı otlar 10-15cm boyda iken çıkış sonrası uygulanır.
Fluazifop-P-butyl 150g/l	EC	75 ml	Domatestede çıkış sonrası darıcan ve kanyaşa karşı önerilir.
Fluazifop-P-butyl 125g/l	EC	100 ml	
Haloxypop-R-methylester %10.8	EC	60 ml	Domates ve biberde çıkış sonrası kanyaşa karşı kullanılır.
Metribuzin %70	WP/WG	50-75 g	Domateslerde dikim sonrası uygulanır.
Metribuzin %75	DF	45 g	Domatestede çıkış sonrası yabancı otların 2–4 yapraklı döneminde kullanılmalıdır.
Pendimethalin % 33	EC	500 ml	Domatestede dikim öncesi uygulanır.
Rimsulfuron %25	SG	5 g + Trend 90 25 ml	Domatestede çıkış sonrası kullanılır.
Quizalofop-p-ethyl %5	EC	100 ml	Domatestede çıkış sonrası dar yapraklılara karşı kullanılır.
Trifluralin %48	EC	200 ml	Domates, biber, patlıcan, fasulyelerde dikim öncesi toprağa uygulanır, uygulamadan sonra 5-7cm toprak derinliğine karıştırılır.



DOMATES HASTALIK ve ZARARLILARI

Ülkemizde zirai mücadelede kullanılan ve aşağıda isimleri yazılı olan Bitki Koruma Ürünü aktif maddelerinin imalatı ve fiili ithalatı **30 Haziran 2011** tarihi itibariyle yasaklanmıştır.

NO	AKTİF MADDELER
1	Benfuracarb
2	Bitertanol
3	Brodifacoum
4	Carbofuran
5	Cycloate
6	Ethalfuralin
7	Fluazifop-P Butyl
8	Flufenoxuron
9	Fluquinconazole
10	Metam potassium
11	Omethoate
12	Propanil
13	Terbuthylazine
14	Thiobencarb
15	Tolyfluanid

Yukarıda isimleri yazılı aktif maddeleri içeren ve piyasada bulunan Bitki Koruma Ürünlerinin kullanımına, **31 Ağustos 2012 tarihine kadar 14 ay süreyle** müsaade edilecektir.